


### ITS en Ciudad Arce de enero a diciembre 2020

En el municipio de Ciudad Arce, se registraron 95 casos por Infecciones de transmisión sexual (ITS) de enero a diciembre 2020, según datos del Ministerio de Salud de El Salvador (MINSAL).

Estos números denotan una disminución en comparación de los casos reportados a la institución en el año de 2019, cuando los números ascendieron a 227.



Fuente: Gráfico elaboración propia del Observatorio de Ciudad Arce con datos proporcionados por OIR MINSAL.

De los casos registrados en el municipio, 61 pertenecen a mujeres, equivalente al 64%, mientras que 34 (36%) fueron hombres.



Al analizar los datos por grupo de edad en todo el departamento de La Libertad, se identifica 7 adolescentes mujeres de 16 años, en el periodo de enero a diciembre de 2020, como se muestra en el siguiente cuadro.

<b>Infecciones de Transmisión Sexual, desagregado por grupo de edad, departamento de La Libertad, enero- diciembre 2020.</b>	
<b>Grupo de edad</b>	<b>Frecuencia</b>
16-17 años	10
18-28 años	43
29-39 años	24
40-50 años	13
51-61 años	1
62-72 años	3
73 o más años	1
<b>Total</b>	<b>95</b>
<b>Fuente: Tabla elaboración propia de ORMUSA con datos de OIR/MINSAL.</b>	

Al clasificar por tipo de ITS, las principales infecciones de transmisión sexual en el municipio de Ciudad Arce fueron las siguientes:

<b>Infecciones de Transmisión Sexual más frecuentes, departamento de La Libertad, enero- diciembre 2020.</b>	
<b>Infecciones de transmisión sexual</b>	<b>Frecuencia</b>
Sífilis	25
Infecciones gonocócicas, no especificadas (causadas por bacteria llamada Neisseria Gonorrhoeae o gonococo)	12
Chancro blando	2
Tricomoniasis	30
Herpes	6
Verrugas	20
<b>Total</b>	<b>95</b>
<b>Fuente: Tabla elaboración propia de ORMUSA con datos de OIR MINSAL.</b>	

### **Sífilis y gonorrea entre las más frecuentes**

La sífilis puede causar complicaciones a largo plazo o la muerte, si no se trata de manera adecuada. Esta ITS se puede contraer mediante el contacto directo con una llaga de sífilis durante las relaciones sexuales anales, vaginales u orales. Las llagas se pueden encontrar

en el pene, la vagina, el ano, el recto o los labios y la boca. La sífilis también puede propagarse de una madre infectada a su bebé.

Algunas síntomas o manifestaciones de la sífilis pueden ser diversas dependiendo de la etapa de desarrollo, por ejemplo: llagas, sarpullido que puede producir en las palmas de las manos y las plantas de los pies, por todo el cuerpo o solo en algunas partes. La sífilis también puede afectar los ojos y causar ceguera permanente. Muchas personas pueden estar infectadas por la sífilis y tener síntomas muy leves o no presentar ningún síntoma<sup>1</sup>.

Qué es la gonorrea?

La gonorrea es una infección muy común, especialmente en las personas jóvenes de 15 a 24 años; puede infectar a hombres y mujeres. Puede causar infecciones en los genitales, el recto y la garganta.

Es posible contraer gonorrea al tener relaciones sexuales anales, vaginales y orales con una persona que tenga esta enfermedad. Una mujer embarazada con gonorrea puede transmitírsela a su bebé durante el parto<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> <https://www.cdc.gov/std/spanish/sifilis/stdfact-syphilis-s.htm>

<sup>2</sup> <https://www.cdc.gov/std/spanish/gonorrea/stdfact-gonorrhea-s.htm>